

Питання щодо вакцинації проти туберкульозу

Роз'яснення за результатами Всеукраїнської розширеної наради фахівців з імунопрофілактики

- Чи однакові штами мікобактерій туберкульозу циркулюють в Україні та Європі? Якщо різні, то чи ефективна вакцина європейського виробника?

- За твердженням ВООЗ, доведеної переваги між існуючими штамами БЦЖ не існує. В Україні протягом останніх 3-х років застосовувався як Данський штам вакцини, так, і штам Росія.

- Чи будуть в Україні використовуватися тести для туберкулінодіагностики („Діаскінтест“)?

- В Україні туберкулінодіагностика залишається основним методом раннього виявлення туберкульозу у дітей. У 2010 р. зареєстрований новий більш чутливий та специфічний препарат для діагностики туберкульозу - алерген туберкульозний рекомбінантний („Діаскінтест“), який вже використовувався в дитячих туберкульозних клініках Києва, Харкова та Херсона).

-□ До якого віку проводиться туберкулінодіагностика?

- Туберкулінодіагностика сьогодні проводиться дітям до 18 років.

-□ Чи можна проводити щеплення вакциною БЦЖ дітям у 8-9 років, якщо вони не отримали їх у 7 років згідно Календаря?

- Як правило, дітей, які не були з будь-яких причин ревакциновані БЦЖ в 7 років, щеплять протягом наступного року. Випадки ревакцинації в більш старших вікових групах виняткові та вирішуються з урахуванням епідепоказань. Перед проведенням щеплення проводиться туберкулінодіагностика. Ревакцинація здійснюється при умові негативної реакції на пробу Манту.

Тубінфікування та перенесений туберкульоз є протипоказанням для ревакцинації.

-□ До якого віку можна проводити вакцинацію проти туберкульозу, якщо в пологовому будинку не проведено вакцинацію, при негативній пробі Манту?

- Якщо не було проведено щеплення БЦЖ за віком (3-5 доба життя), його слід провести якомога швидше. Коли дитина не щеплена з якихось причин, в умовах епідемії слід провести щеплення. Обов'язковою умовою є відсутність протипоказань до щеплення та негативна реакція на пробу Манту. За необхідністю, перед щепленням БЦЖ можлива консультація дитини у дитячого фтизіатра.

-□ Хто закуповує туберкулін для постановки проби Манту - держава чи ЛПЗ?

- З 2012 р. планується закупівля туберкуліну за рахунок місцевих бюджетів. Для отримання інформації щодо питань, пов'язаних із забезпеченням областей туберкуліном, слід звертатися до Державної служби протидії ВІЛ/СНІДУ та іншим соціально-небезпечним хворобам МОЗ України.

-□ Чи дозволено проводити доохоплення щепленнями дітей вакциною БЦЖ SSI (Данія) на дільницях відповідно з останніми листами МОЗ?

- Якщо дитина не була щеплена в пологовому будинку за віком через відсутність вакцини БЦЖ, не має протипоказань для щеплення, можливе проведення щеплення вакциною БЦЖ SSI.

-□ Чи робитимуть дитині БЦЖ вдруге, коли немає рубчика після першого щеплення ?

- Якщо достовірно відомо та документально підтверджено, що дитина щеплена БЦЖ, повторне щеплення не проводять при позитивному або сумнівному результаті проби Манту. В іншому випадку - так.

